

ประชาสัมพันธ์การเผ่าะวังและรู้จักกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เขียนโดย นักประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 10:17 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 10:25 น.

เขียนโดย นักประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 10:17 น. - แก้ไขล่าสุด วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 เวลา 10:25 น.



ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจากยุงลาย

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคซิก้า เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูล เทลิวไรรัส (Togavirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเด็งกี ไวรัสชาลด์ส และไวรัสโธมัสอีกเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์

อาการ

- มีไข้
- ตาแดง
- มีผื่นแดง
- อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
- ปวดข้อ
- ปวดกล้ามเนื้อ

หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะหายภายในเวลา 2-7 วัน

⚠️ การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะพิการเด็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

ส่วนใหญ่เมื่อการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...

- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ดื่มน้ำมากๆ
- หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล ห้ามกินแอสไพริน

➡ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์

การป้องกัน

- สวมเสื้อกั๊กที่มีมิดชิด ใช้ยาทากันยุง
- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด

ข้อมูลจาก สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข